Байцидал® ВП 25%

Нет личинок – нет насекомых

- Обладает ларвицидным и овицидным действием
- Обладает 100% эффективностью в отношении личинок[1]
- Эффективно снижает популяцию насекомых
- Удобно рассчитать дозировку, просто использовать
- Легко контролировать расходы на дезинсекцию

Часть программы
БАЙОБЕЗОПАСНОСТЬ

BAYER

Science For A Better Life

Приготовление рабочего раствора и применение

Состав препарата Байцидал® ВП 25% – трифлумурон 25%;
форма выпуска – водосмачиваемый порошок, 1 кг.

Приготовление рабочего раствора:

Рабочий раствор препарата Байцидал® применяют для обработки мест расплода насекомых.

Для обработки пола: расход препарата Байцидал® составляет 2 г на 1 м^2 обрабатываемой поверхности.

Для обработки навозохранилищ: расход препарата Байцидал® составляет 8 г на 1 м^2 обрабатываемой поверхности.

Необходимо сначала приготовить маточный раствор препарата Байцидал® в небольшой ёмкости, а затем растворить в общем объеме воды.

При приготовлении рабочего раствора препарата Байцидал® необходимо учитывать объемный вес продукта:

100 г препарата соответствует отметке 400 мл в мерном стакане.

Относится к 3 классу опасности по классификации ВОЗ – умеренно опасные вещества.

Количество препарата Байцидал® (г, мл) и воды (л) для обработки пола

Площадь пола, м^2	Количество Байцидал®, г	Количество Байцидал®, мл	Количество воды*, л
10	20	80	3
100	200	800	30
500	1000	4000	150
1000	2000	8000	300

Применение:

При работе с рабочим раствором средства Байцидал® используют распыляющую аппаратуру различных марок.

Рабочим раствором препарата Байцидал® обрабатывают горизонтальные поверхности:

- Пол, подстилка, навозные желоба, участки с транспортерами пометоудаления, вокруг опорных конструкций, под поилками и кормушками, места опоры щелевого пола на бортах ванн навозонакопления, места скопления органических отходов.
- Навозные ямы и лагуны – поверхность жижи, зона вокруг (при загрязнении).

После уменьшения численности насекомых дозу препарата можно снизить в 2 раза.

Обработки препаратом Байцидал® проводят каждые 2 недели, минимум трехкратно.

Количество препарата Байцидал® (г, мл) и воды (л) для обработки навозохранилищ

Площадь, пов-ти навозохранилища, м^2	Количество Байцидал®, г	Количество Байцидал®, мл	Количество воды*, л
10	80	320	5
100	800	3200	50
500	4000	16000	100
1000	8000	32000	500

* Объем воды зависит от типа помещения. Возьмите такое количество воды, какое вы обычно тратите на дезинфекцию.

1. Журнал "Птицеводство" №4, 2015 г. УДК 595.76.

Байцидал®
ВП 25%

АО «Байер», 107113, Москва,
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон:+7 (495) 234-20-65
ru-animal-health@bayer.com
www.animalhealth.bayer.ru