



Максфорс

Ультрагель ИК



Муравьи



Тараканы

**ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
ТАРАКАНОВ
И МУРАВЬЕВ**





Назначение

Максфорс Ультрагель ИК - инсектицидное средство для борьбы с тараканами и муравьями на объектах различной категории, а также населением в быту

Действующее вещество:	имidakлоприд
Способ действия:	контактно-кишечный инсектицид
Препаративная форма:	гель
Срок годности:	4 года
Упаковка:	шприц 20гр

Преимущества

- Контроль всех видов тараканов и муравьев
- Гель имеет стабильную консистенцию - не растекается на вертикальных поверхностях
- Длительный эффект после применения (1,5-2 месяца)
- Быстрое действие - мертвые насекомые видны уже после 24 часов
- Картридж 20г надежно защищает квартиру площадью 70м² (где площадь кухни и ванной порядка 15м²) на протяжении 1,5-2 лет
- Удобный, готовый к применению, легко открывающийся и закрывающийся картридж
- Легок в применении, для обработки кухни и ванной достаточно 10 мин
- Белый гель для чистых обработок, незаметен после применения
- Не оставляет пятен на всех видах поверхностей
- Высококачественная формуляция - устойчивость к высыханию
- Привлекательная пищевая приманка и коллоидные ингредиенты для сохранения вкусовой привлекательности и сохранения необходимой влажности
- Быстрое, точное и аккуратное применение
- Применим в широком диапазоне различных условий



Рекомендации

Максфорс Ультрагель ИК - инсектицидный препарат в виде геля, содержащий в качестве действующего вещества высокоактивное соединение из группы неоникотиноидов имidakлоприд в концентрации 2,15%, а также привлекающая насекомых вкусовая добавка, коллоидный материал, поддерживающий вкусовую привлекательность и служащий источником жидкости, консерванты.

Препарат обладает острым инсектицидным действием в отношении тараканов и муравьев. Остаточная активность препарата после обработки в течение 1,5 – 2 месяца.

Препарат Максфорс Ультрагель ИК предназначен для применения на объектах различных категорий (включая детские, лечебные, пищевые) в практике медицинской дезинсекции, а также населением в быту.

Препарат по параметрам острой токсичности и введении в желудок и нанесению на кожу относится к 4 классу малоопасных опасных веществ, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

Перед обработкой желательнее провести уборку помещения. Собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники корма, накрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги.

Гель небольшими каплями (одна капля = 0,1 гр = в диаметре 0,5 см) вводят из шприца в трещины, щели и другие труднодоступные места, которые могут служить укрытием для тараканов и муравьев. Обработке подлежат также другие места обнаружения возможного обитания или передвижения тараканов: под раковинами, холодильниками, около ведер или бачков для мусора и пищевых отходов, около стояков и труб горячего водоснабжения, трещины и щели в стенах и полу, пороги, плинтусы, облицовочные покрытия, стыки трубы пр.

При борьбе с муравьями гель наносят вдоль путей передвижения («дорожек»).

Также гель может наноситься с наружи помещений в местах, защищенных от осадков.

Повторяют обработки по энтомологическим показаниям.

Лица, работающие со средством должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (согласно инструкции по применению).



Объект	Норма расхода в зависимости от заселенности, на каждый м ² мест обитания насекомых* <i>*(не путайте с площадью пола помещения)</i>	
	Низкая степень заселенности	Высокая степень заселенности
Рыжий прусак, мебельный (коричнево-полосый) тараканы	Одна капля *0,1 г	Две капли *0,1 г
Черный (восточный), американский, австралийский тараканы	Две капли *0,1 г	Три капли *0,1 г
Муравьи (рыжие домашние, черные лесные)	Одна капля *0,1 г (вдоль передвижения “дорожек” внутри и снаружи помещений)	Две капли *0,1 г (вдоль передвижения “дорожек” внутри и снаружи помещений)

Избегайте:

- Слишком запыленных, жирных, затопляемых мест
- Мест откуда гель вероятнее всего будет смыт или удален
- Применения других инсектицидов в период защитного действия геля
- Большое количество маленьких капель эффективнее нескольких больших капель
- По прошествии времени, при необходимости повторите обработку
- Удаляйте нанесенный гель в нежелательных местах протиранием 5% раствором соды



Bayer

АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 234-20-00 (доб. 3181), факс: 8 (495) 234-20-01

За технической консультацией обращаться в АО «БАЙЕР» г. Москва
тел.: +7 (495) 234-20-00 (доб. 3181), e-mail: olga.saveleva@bayer.com
Бизнес менеджер направления «Профессиональные продукты» Савельева Ольга
www.bayercropscience.ru
www.environmentalscience.bayer.ru
www.pestcontrol.bayer.ru